

Regressão linear simples

Ivan Bezerra Allaman

October 28, 2014

Introdução

- ▶ Foi visto na aula anterior que o coeficiente de correlação de Pearson é utilizado para mensurar o grau de associação entre duas variáveis quantitativas.
- ▶ E se o nosso interesse for ir além disso, ou seja, se estivermos interessados em saber o quanto o aumento no número de horas de treinamento de um empregado irá reduzir o número de acidentes daquele empregado?
- ▶ Ou ainda, o aumento em uma hora de sono irá aumentar em quanto o tempo de reação de uma pessoa?
- ▶ E se estivéssimos interessados em prever o tempo de reação de uma pessoa para uma determinada quantidade de horas de sono. Como fazer?
- ▶ Para responder a estas perguntas utilizaremos a análise de regressão linear simples.

Objetivo

- ▶ Estudar a relação funcional entre duas variáveis quantitativas.
- ▶ Estabelecer um modelo para entender a relação funcional entre as variáveis.
- ▶ Fazer previsões como o modelo ajustado principalmente para valores que não foram observados na amostra.

O modelo

- ▶ O modelo matemático que estabelece a relação funcional entre duas variáveis é definido como:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$$

em que:

y = é a variável dependente




β_0 = é o coeficiente linear ou intercepto da reta de regressão

β_1 = é o coeficiente angular ou inclinação (declive) da reta de regressão

x = é a variável independente

ε = é o erro aleatório referente a variabilidade em y quem não pode ser explicada pela variável x .

Possíveis retas de regressão linear simples



Entendendo o comportamento de β_0 e β_1

- ▶ [Acesse aqui](#)

Ajuste da regressão

- ▶ Agora que já entendemos como funciona os parâmetros de uma regressão, chegou a hora de ajustarmos um modelo de regressão aos dados provenientes de uma amostra.
- ▶ Observemos a seguinte situação
 - ▶ Suponhamos que o dono de uma rede de restaurantes esteja interessado em saber a relação entre a quantidade de estudantes que almoçam em seus restaurantes com o lucro obtido trimestralmente.
 - ▶ Uma amostra de dez restaurantes foi coletado e os dados podem ser visualizados a seguir:

##	restaurante	estudantes	vendas_trimestrais
## 1	1	2	58
## 2	2	6	105
## 3	3	8	88
## 4	4	8	118
## 5	5	12	117
## 6	6	16	137
## 7	7	20	157

Método dos mínimos quadrados

- ▶ A idéia é encontrar valores de **b** e **a** que faça com que a reta de regressão passe na menor distância possível entre os pontos observados, minimizando o máximo possível o erro e fazendo com que o modelo explique o máximo possível a variabilidade dos dados.
- ▶ As letras **b** e **a** são os estimadores dos parâmetros β_0 e β_1 respectivamente.
- ▶ Primeiramente vamos demonstrar o método de maneira interativa, ou seja, vamos tentar encontrar valores de **b** e **a** que minimiza a soma de quadrados do erro.
- ▶ Acesse aqui
- ▶ Matematicamente o que queremos é minimizar a seguinte quantidade:

$$\sum \varepsilon^2 = \sum (y - \beta_0 - \beta_1 x)^2$$

- ▶ Qual é o mínimo que desejamos para $\sum \varepsilon^2$? 

Exemplo

- ▶ Voltando ao exemplo anterior, vamos obter as estimativas de a e b para elaborarmos uma equação de regressão.

```
#----- opção 1 - na unha!-----  
sumxy = sum(estudantes*vendas_trimestrais)  
sumxsumy = sum(estudantes)*sum(vendas_trimestrais)  
n = length(estudantes)
```

```
sumx2 = sum(estudantes^2)  
sumx = sum(estudantes)
```

```
# Portanto, b é igual:
```

```
b = (sumxy - sumxsumy/n)/(sumx2 - (sumx)^2/n)  
b
```

```
## [1] 5
```

```
# Calculando a tem-se:
```